BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan karakteristik didapatkan bahwa paling banyak responden berusia pada kategori dewasa awal (26 – 35 tahun) yaitu sebanyak 45 orang (83,3%), berpendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 23 orang (42,6%), bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 22 orang (40,7%) dan dengan IMT kategori gemuk yaitu sebanyak 49 orang (90,7%) di Ruang Operasi RSI Siti Rahmah.
2. Pada kelompok IONV Paling banyak responden mengalami mual muntah ringan yaitu sebanyak 32 orang (59,3%) di Ruang Operasi RSI Siti Rahmah.
3. Pada kelompok PONV Paling banyak responden tidak mengalami mual muntah yaitu sebanyak 26 orang (48,1%) di Ruang Operasi RSI Siti Rahmah.
4. Ada perbandingan Kejadian *Intra Operative Nausea And Vomiting* (IONV) dan *Post Operative Nausea And Vomiting* (PONV) pada pasien *sectio caesarea* spinal anestesi di Ruang Operasi RSI Siti Rahmah dengan nilai $p = 0.022$.

B. Saran

1. Kepada Penata Anestesi di RSI Siti Rahmah Padang

Disarankan kepada penata anestesi yang menangani pasien *sectio caesarea*, dengan spinal anestesi agar melakukan pengkajian terhadap

karakteristik responden yang dapat menyebabkan risiko terjadinya IONV dan PONV sehingga dapat dilakukan tindakan pecegaha sebelum dilakukan operasi.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor resiko kejadian IONV pada pasien SC dengan spinal anestesi.

3. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi rumah sakit sebagai masukan dan pertimbangan dalam menyikapi masalah mual muntah pada pasien SC dengan spinal anestesi.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Agar dapat menjadi sumber wawasan ilmu baru bagi perpustakaan Universitas Baiturrahmah khususnya bagi mahasiswa program studi keperawatan Anestesiologi Universitas Baiturrahmah