

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Gambaran tingkat kecemasan pada pasien penderita kanker payudara pre operasi Menggunakan Kuesioner APAIS di RSUP.DR. M.Djamil Padang” didapatkan kesimpulan bahwa

1. Distribusi penderita kanker payudara pada masa pre operasi di RSUP.DR. M.Djamil Padang berdasarkan usia didapatkan terbanyak berada pada katagori di atas 45 tahun.
2. Distribusi berdasarkan pendidikan terakhir pasien didapatkan bahwa sampel paling menonjol yaitu terdapat pada responden dengan pendidikan akhir SMA.
3. Distribusi karakteristik pasien berdasarkan pekerjaan didapatkan jumlah responden yang menonjol berada pada kategori tidak bekerja.
4. Distribusi karakteristik pasien berdasarkan riwayat operasi didapatkan jumlah yang menonjol pada kategori pasien yang belum pernah menjalani operasi.
5. Hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 59 responden yang akan melakukan operasi kanker payudara di RSUP. Dr. M. Djamil Padang menggunakan *Amsterdamp Preoperative Anxiety and Information scale* (APAIS) didapatkan bahwa kebanyakan pasien pre operasi mengalami kecemasan dengan tingkatan ringan.

7.2 Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menetapkan kriteria inklusi responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti responden dengan tingkat pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi, guna meningkatkan validitas pemahaman terhadap isi kuisisioner.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk proses pengisian kuisisioner dilakukan secara langsung oleh pasien, sejauh kondisi pasien memungkinkan. Apabila pasien memerlukan bantuan pendamping, peneliti perlu memberikan *informed consent* kepada pendamping serta

mengarahkan agar pendamping tidak memengaruhi dan mengarahkan jawaban pasien.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan desain penelitian analitik dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan kecemasan pre operasi tersebut, sehingga dapat mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel.